

Impfkalender

Impfstoff/Antigen-Kombinationen	Alter in Monaten						Alter in Jahren				
	Geburt	2	3	4	11-14	15-23 siehe a)	5-6	9-11	12-17	Ab 18	Ab 60
Tetanus (T) *		1.	2.	3.	4.		A	A	A	A*****	A*****
Diphtherie (D/d) * siehe b)		1.	2.	3.	4.		A	A	A	A*****	A*****
Keuchhusten (aP/ap) *		1.	2.	3.	4.		A	A	A		
Hib *		1.	2.c)	3.	4.						
Poliomyelitis (IPV) *		1.	2.c)	3.	4.				A		
Hepatitis B (HB) *	d)	1.	2.c)	3.	4.				G		
Pneumokokken **		1.	2.	3.	4.						S
Meningokokken					1.e)	ab 12 Monate					
Mumps Masern Röteln (MMR) ***					1	2					
Varizellen					1	f)					
Influenza ****											S
HPV *****									SM		

Quelle: STIKO / Stand: Juli 2007

- A** Auffrischimpfung, sollte möglichst erst fünf Jahre nach der letzten Impfung erfolgen.
- G** Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes.
- S** Standardimpfungen mit allgemeiner Anwendung = Regelimpfungen.
- SM** Standardimpfung für Mädchen.
- a)** Zu diesen Zeitpunkten soll der Impfstatus unbedingt überprüft und ggf. vervollständigt werden.
- b)** Ab einem Alter von fünf bzw. sechs Jahren wird zur Auffrischung ein Impfstoff mit reduziertem Diphtherietoxoid-Gehalt (d) verwendet.
- c)** Bei monovalenter Anwendung bzw. bei Kombinationsimpfstoffen ohne Pertussiskomponente kann diese Dosis entfallen.
- d)** Siehe Anmerkungen „Postexpositionelle Hepatitis-B-Immunprophylaxe bei Neugeborenen“ (*Robert Koch Institut. Epidemiologisches Bulletin* 30/2007, S. 269)
- e)** Zur Möglichkeit der Koadministration von Impfstoffen sind die Fachinformationen zu beachten.
- f)** Bei Anwendung des Kombinationsimpfstoffes MMRV (Masern, Mumps, Röteln, Varizellen) sind die Angaben des Herstellers zu beachten. Entsprechend den Fachinformationen ist die Gabe einer zweiten Dosis gegen Varizellen erforderlich. Zwischen beiden Dosen sollten vier bis sechs Wochen liegen.
- *** Abstände zwischen den Impfungen der Grundimmunisierung mindestens vier Wochen; Abstand zwischen vorletzter und letzter Impfung mindestens sechs Monate.
- **** Generelle Impfung gegen Pneumokokken für Säuglinge und Kleinkinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr mit einem Pneumokokken-Konjugatimpfstoff; Standardimpfung für Personen ab 60 Jahren mit Polysaccharid-Impfstoff und Wiederimpfung im Abstand von sechs Jahren.
- ***** Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 Wochen.
- ****** Jährlich mit dem von der WHO empfohlenen aktuellen Impfstoff.
- ******* Grundimmunisierung mit drei Dosen für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren.
- ******* Wiederimpfung jeweils zehn Jahre nach der letzten vorangegangenen Dosis.